

រោគរមែង

មេសា 2015 | ទំព័រ 1 នៃ 2

តើអ្វីទៅជារោគរមែង (TB)?

រោគរមែង TB គឺជាការឆ្លងរោគ ឬជំងឺដែលបង្កដោយមេរោគដែលអ្នកដកដង្ហើមចូលក្នុងសួតរបស់អ្នក។ រោគរមែង TB មានពីរប្រភេទ ៖ ការឆ្លងរោគរមែង TB និងជំងឺរមែង TB ។

តើអ្វីទៅជាការឆ្លងរោគរមែង TB?

ការឆ្លងរោគរមែង TB គឺជាប្រភេទរោគរមែង TB ដែលអ្នកមានចំនួនមេរោគរមែង TB តិចតួច ដែលនៅសល់មានជីវិត ក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក ប៉ុន្តែវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកឡើយ។ ការការពាររាងកាយរបស់អ្នក (ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយពីជំងឺរបស់អ្នក) នឹងរក្សាមេរោគរមែងពីការបង្កបញ្ហានានា។ អ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ អ្នកមិនឈឺ ហើយអ្នកមិនអាចចម្លែងមេរោគរមែង TB ទៅអ្នកណាម្នាក់។ បើអ្នកមានការឆ្លងរោគរមែង TB ហើយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយពីជំងឺរបស់អ្នក ទៅជាទន់ន្សាយពីជំងឺផ្សេងទៀត ឬពីឱសថដែលអ្នកអាចពិសានោះ ការឆ្លងរោគរមែង TB របស់អ្នក អាចវិវត្តទៅជាជំងឺរមែង TB ។ ពេលខ្លះការឆ្លងរោគរមែង TB ហៅថារោគរមែង TB "ដែលសម្ងំ" ឬ "ដេក"។

តើអ្វីទៅជាជំងឺ TB?

ជំងឺរមែង TB គឺជាប្រភេទរោគរមែង TB ដែលអ្នកមានចំនួនមេរោគរមែង TB ជ័រច្រើន ដែលមានជីវិតក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក ហើយមេរោគនានានឹងបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់។ តាមធម្មតាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឈឺ ហើយជានិច្ចកាលអ្នកអាចចម្លែងមេរោគរមែង TB ទៅអ្នកដទៃទៀត។ ជំងឺរមែង TB អាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់អ្នក ប៉ុន្តែធម្មតាមានផលប៉ះពាល់ដល់សួតរបស់អ្នក។ រោគសញ្ញាជំងឺរមែង TB ធម្មតាភាគច្រើនគឺ ក្អក, គ្រុនក្តៅខ្លួន, ការបាត់បង់ចំណង់បរិភោគ, ការបាត់បង់ទម្ងន់, ភាពខ្សោយ, ការបែកញើសពេលយប់ និងមានអារម្មណ៍ហត់។

តើអ្នកឆ្លងជំងឺរមែង TB យ៉ាងដូចម្តេច?

មេរោគរមែង TB ចូលទៅក្នុងខ្យល់ នៅពេលអ្នកណាម្នាក់មានជំងឺរមែង TB ក្នុងសួត ក្អក កណ្តាស់ និយាយ ឬច្រៀង។ មនុស្សដែលកំពុងរស់នៅ ធ្វើការ ឬចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនជាមួយបុគ្គលនេះ ដែលដកដង្ហើមខ្យល់ដូចគ្នា។ ពួកគេអាចដកដង្ហើមចូលមេរោគរមែង TB ហើយឆ្លងជំងឺរមែង TB ។ អ្នកមិនអាចឆ្លងមេរោគរមែង TB ពីមនុស្សម្នាក់ដែលមានការឆ្លងរោគរមែង TB ឡើយ។

តើអ្នកអាចឆ្លងមេរោគរមែង TB ពីការចែករំលែកអាហារឬទេ?

ទេ។ មេរោគរមែង TB ឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត តាមខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកមិនអាចឆ្លងមេរោគរមែង TB តាមការចែករំលែកអាហារ ឬការឱ្យអាហារ ឬវត្ថុផ្សេងៗទៀតឡើយ។

តើអ្នកណាស្ថិតក្នុងហានិភ័យចំពោះការឆ្លងជំងឺរមែង TB?

មនុស្សស្ថិតក្នុងហានិភ័យចំពោះការឆ្លងជំងឺរមែង TB គឺអ្នកទាំងនោះដែលបានទាក់ទងមនុស្សដែលមានជំងឺរមែង TB នៅអំឡុងពេលពួកគេក្នុងមានមេរោគរមែង TB ចូលទៅក្នុងខ្យល់។ មនុស្សដែលបានរស់នៅតំបន់នានានៃពិភពលោក ដែលជាទីកន្លែងមានមេរោគរមែង TB យ៉ាងច្រើន ដែលស្ថិតកម្រិតហានិភ័យចំពោះការឆ្លងរោគរមែង TB ។



រោគរមែង

មេសា 2015 | ទំព័រ 2 នៃ 2

តើមានការធ្វើតេស្តចំពោះការឆ្លងរោគរមែង TB ឬទេ?

បាទ/ចាស៎។ មានប្រភេទខុសគ្នាចំនួនពីរសម្រាប់ការធ្វើតេស្តចំពោះការឆ្លងរោគរមែង TB គឺការធ្វើតេស្តឈាម និងការធ្វើតេស្តស្បែក។ ការធ្វើតេស្តទាំងពីរនេះ អាចរកឃើញ បើអ្នកមានមេរោគរមែង TB ក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក។ ដោយមានការធ្វើតេស្តឈាមនោះ បរិមាណឈាមរបស់អ្នកតិចតួច ត្រូវបានយកសម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះ។ ដោយមានការធ្វើតេស្តស្បែកនោះ បរិមាណរត្តរាវតិចតួច ត្រូវដាក់ក្រោមស្បែកកំភួនដៃ។ អ្នកនឹងត្រូវការវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេលពីរ ឬបីថ្ងៃ ដើម្បីឱ្យវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិលានុបដ្ឋាឬគិលានុបដ្ឋាយិការបស់អ្នក ពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តស្បែក។ បើការធ្វើតេស្តរោគរមែង TB របស់អ្នកគឺវិជ្ជមានឬឱ្យហេតុថាមានជំងឺ វាមានន័យថាអ្នកមានមេរោគរមែង TB ហើយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអាចបញ្ជាឱ្យមានការថតអិចដេ X-ray ដើមទ្រូង ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមិនឈឺដោយជំងឺរមែង TB ។

តើការឆ្លងរោគរមែង TB អាចព្យាបាលឬទេ?

បាទ/ចាស៎។ វេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិលានុបដ្ឋាឬគិលានុបដ្ឋាយិការបស់អ្នក អាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវឱសថចំនួនមួយ ឬច្រើន ដើម្បីព្យាបាលការឆ្លងរោគរមែង TB ។ អ្នកនឹងញាំថ្នាំរយៈពេល 3 ដល់ 9 ខែ អាស្រ័យលើឱសថ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីញាំថ្នាំសម្រាប់ការឆ្លងរោគរមែង TB ដូច្នោះវាមិនវិលត្រឡប់ទៅរកជំងឺរមែង TB ឡើយ។

តើជំងឺរមែង TB អាចព្យាបាលឬទេ?

បាទ/ចាស៎។ បើអ្នកមានជំងឺរមែង TB អ្នកនឹងញាំថ្នាំរោគរមែង TB ជាច្រើន រយៈពេលយ៉ាងតិច 6 ខែ ដើម្បីព្យាបាលជំងឺរមែង TB ។

តើអ្វីទៅជាជំងឺរមែង TB ដែលមានវេស៊ីស្តង់ឬស្មៅនឹងថ្នាំ?

ជំងឺរមែង TB ដែលមានវេស៊ីស្តង់ឬស្មៅនឹងថ្នាំ បង្កពីមេរោគរមែង TB ដែលមិនអាចសម្លាប់ដោយប្រើថ្នាំធម្មតា។ បើអ្នកមានជំងឺរមែង TB ដែលមានវេស៊ីស្តង់ឬស្មៅនឹងថ្នាំ អ្នកអាចត្រូវញាំថ្នាំរោគរមែង TB ខុសៗគ្នា និងច្រើនថែមទៀត រយៈពេលយ៉ាងតិច 12 ខែ។ ជំងឺរមែង TB អាចក្លាយជាវេស៊ីស្តង់ឬស្មៅនឹងថ្នាំ បើអ្នកកមិនញាំថ្នាំរោគរមែង TB របស់អ្នក ស្របតាមការណែនាំ ឬបើអ្នកឈប់ញាំថ្នាំមុនការព្យាបាលរបស់អ្នក ត្រូវបានបញ្ចប់។ អ្នកអាចឆ្លងជំងឺ TB ដែលមានវេស៊ីស្តង់ឬស្មៅនឹងថ្នាំ បើមេរោគដែលអ្នកបានដកដង្ហើមចូលនោះ មកពីមនុស្សមានជំងឺរមែង TB ដែលមានវេស៊ីស្តង់ឬស្មៅនឹងថ្នាំ។

តើអ្វីទៅជា BCG?

BCG គឺជាថ្នាំបង្ការប្រឆាំងនឹងរោគរមែង TB ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនប្រទេសនានាដែលជាទឹកដីនៃរោគរមែង TB ដែលឃើញមានគ្រប់កន្លែង។ វាអាចជួយការពារទារក និងកុមារតូចៗពីជំងឺរមែង TB ។ ថ្នាំ BCG ដែលល្អបំផុត ការពារកុមាររហូតដល់ 5 ឆ្នាំ ហើយពេលខ្លះវាមិនការពារប្រឆាំងនឹងរោគរមែង TB ឡើយ។ ថ្នាំនេះកម្រប្រើប្រាស់ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

តើថ្នាំបង្ការរោគ BCG អាចបង្កឱ្យមានការធ្វើតេស្តរោគរមែង TB វិជ្ជមានឬឱ្យហេតុថាមានជំងឺឬទេ?

ថ្នាំ BCG មិនបង្កឱ្យមានលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឬឱ្យហេតុថាមានជំងឺឡើយ។ តាមធម្មតាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តស្បែករោគរមែង TB វិជ្ជមានឬឱ្យហេតុថាមានជំងឺពីមេរោគរមែង TB នៅក្នុងរាងកាយ, មិនមែនមកពីថ្នាំបង្ការ BCG ឡើយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរោគរមែង TB សូមទាក់ទងមកគណៈកម្មការទីក្រុងឬទីក្រុងតូចៗ ឬក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត Massachusetts, កម្មវិធីរោគរមែងតាមលេខ ៖ (617) 983-6970 ឬ

<http://www.mass.gov/dph/cdc/tb/>។