

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី 22 ខែមករា ឆ្នាំ 2025

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ (Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) ត្រូវបានរកឃើញទាំងនៅក្នុងសត្វស្លាបព្រៃដែលរស់នៅនឹងទឹក បក្សីក្នុងស្រុក ឬទាំងពីរនេះនៅទូទាំងប្រទេស។ ការឃ្លាំមើលបក្សីស្រុក និងបក្សីព្រៃដែលមានមេរោគ HPAI នៅរដ្ឋ MA កំពុងដំណើរការបន្ត។

បសុបក្សីស្រុកទាំងអស់នៅរដ្ឋ Massachusetts មានហានិភ័យនៃការប៉ះពាល់នឹងមេរោគ HPAI ។

ជីវសុវត្ថិភាពពួកគេចាំបាច់ ដើម្បីការពារបក្សីរបស់អ្នក និងកន្លែងរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងមេរោគ។

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សត្វស្លាប និងថនិកសត្វព្រៃ ឬស្រុក។ បសុបក្សីភាគច្រើន រួមទាំងមាន់ ទូតិ សត្វស្លាបប្តីណេ និងបក្សីហ្គេមដូចជាសត្វក្អាក និងស្លាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់នឹងមេរោគ HPAI។ ទាព្រៃ និងទាស្រុក និងប្រភេទសត្វមួយចំនួនទៀត អាចឆ្លងមេរោគដោយមិនបង្ហាញថាមានជំងឺ។ បសុបក្សីស្រុកទទួលបាននូវការប៉ះពាល់នឹងមេរោគ HPAI តាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយបក្សីដែលឆ្លងមេរោគ ដូចជាដំណាក់ទឹក ឬមេរបស់ពួកវា។ វាលស្មៅ ទីល្ងា ស្រះទឹក និងឧបករណ៍ងាយឆ្លងមេរោគ HPAI។ មនុស្សបានឆ្លងមេរោគ HPAI នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ទោះបីជាមនុស្សភាគច្រើនមានទំនាក់ទំនងជាមួយបសុបក្សី ឬគោយកទឹកដោះក៏ដោយ ហើយការឆ្លងមេរោគភាគច្រើនគឺមានកម្រិតស្រាល។ មនុស្សក៏អាចផ្លាស់ទីសម្ភារៈដែលមានមេរោគ HPAI ដោយអចេកនា ចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយបក្សីស្រុក ឬគោយកទឹកដោះផងដែរ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កម្ទេង សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង និងសំបកកង់រថយន្ត។ ថនិកសត្វដែលដើរកង់ចំណីប៉ះនឹងបក្សីស្លាប់ដែលមានមេរោគ ក៏អាចឆ្លងមេរោគផងដែរ។ សត្វគោក្របីយកទឹកដោះនៅរដ្ឋ Texas បានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាមានឆ្លងមេរោគ HPAI (H5N1) នៅនិទាឃរដូវឆ្នាំ 2024 ហើយការផ្លាស់ទីគោក្របីបានរីករាលដាលមេរោគទៅកាន់រដ្ឋប៉ាន់ប៉ុន្មាន។ ឧបករណ៍រួម យានជំនិះ និងបុគ្គលិកដែលប្រើរួមគ្នា និងធ្វើឱ្យមានការរីករាលដាលបន្ថែមទៀត។ បសុបក្សីគឺងាយឈឺយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគ្រប់ជំនាន់មេរោគនេះ។

ការអនុវត្តជីវសុវត្ថិភាពមានន័យថាការចាត់វិធានការចាំបាច់ ដើម្បីកាត់បន្ថយឱកាសនៃជំងឺឆ្លងដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុង ឬនៅក្រៅកសិដ្ឋានរបស់អ្នក។ វិធានការទីមួយគឺត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យដ៏ធំបំផុតចំពោះបក្សី ឬកសិដ្ឋានរបស់អ្នកពីជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សី។

កាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ហ្វូងសត្វ

- ការទប់ស្កាត់សត្វស្លាបក្នុងស្រុកពីការចូលទៅកាន់ស្រះ អូរ និងតំបន់ដីសើមដែលមានហ្វូងសត្វព្រៃដែលជាសត្វទឹកញឹកញាប់មានសារៈសំខាន់ណាស់។ ការប៉ះពាល់នឹងតំបន់ទាំងនោះ គឺជាតំណភ្ជាប់បង្កឱ្យមានការឆ្លងមេរោគហ្វូងសត្វស្រុកទាំងអស់នៅរដ្ឋ New England។ ការអនុញ្ញាតឱ្យហ្វូងសត្វរបស់អ្នក "ធ្វើដំណើរដោយសេរី" បង្កហានិភ័យខ្ពស់ពីការប៉ះពាល់ជាមួយមេរោគ HPAI។ ផលវិបាកនានាអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់។



- មិនត្រូវដាក់សត្វស្លាបពេញវ័យទៅក្នុងហ្វូងសត្វដែលបានបង្កើនរៀបចំ លុះត្រាតែពួកវាត្រូវដាក់នៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល 30 ថ្ងៃ និង/ឬ ត្រូវធ្វើតេស្តថាគ្មានជំងឺ។ ព្យាបាលសត្វស្លាបដែលត្រឡប់មកពីការសម្តែង បើសត្វស្លាបថ្មីដាក់ទៅនឹងហ្វូងសត្វ។
- មិនត្រូវដាក់ប្រភេទសត្វផ្សេងៗគ្នាឱ្យនៅជាមួយគ្នា (ឧ. មាន់ជាមួយទូតិ ឬសត្វស្លាបដែលរស់នៅនឹងទឹក)។
- រារាំងអ្នកទស្សនាមិនឱ្យចូលសួរសត្វ ឬទ្រុឌរបស់អ្នក។ មិនត្រូវទៅកន្លែងបសុបក្សីផ្សេងទៀតឡើយ។
- បង្គោលសត្វស្លាបនានានៅកន្លែងខាងក្នុង (ទ្រុង កន្លែងរត់ ឬកន្លែងខាងក្រៅដែលមានគំរប់)។
- មិនត្រូវប្រើឧបករណ៍ គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ ឬយានជំនិះរួមគ្នាជាមួយម្ចាស់បក្សីផ្សេងទៀតឡើយ។
- ប្រើស្បែកជើងកង់ដែលសម្លាប់មេរោគមុនពេលចូលទៅក្នុងទ្រុង ឬកន្លែងបក្សីផ្សេងទៀត។
- សម្អាត និងសម្លាប់មេរោគឧបករណ៍ ស្បែកជើង សម្លៀកបំពាក់ និងយានជំនិះទាំងអស់ មុនពេលចូលទៅទីកន្លែងបសុបក្សី។
- យកចូលកម្ទេង និងលាមកចេញពីផ្ទះទ្រុងមុននឹងសម្លាប់មេរោគ។ "លោកអ្នកមិនអាចសម្អាតចូលកម្ទេងបានទេ។"
- អនុវត្ត " ទាំងអស់ទាំងពេលចូល ទាំងពេលចេញ" នៅពេលផ្លាស់ប្តូរហ្វូងសត្វ។ កម្ចាត់មេរោគសត្វស្លាបទាំងអស់ និងសម្លាប់មេរោគនៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វមុននឹងទទួលសត្វស្លាបថ្មី។
- ពិនិត្យរកបាក់ស៊ីតប្រចាំខែ និងព្យាបាល បើចាំបាច់។ ប្រើកន្លែងសម្អាតចូល ដើម្បីការពារបាក់ស៊ីតខាងក្រៅ។
- រក្សាសត្វល្អិត និងសត្វ ដូចជាសត្វចិញ្ចឹម សត្វកកេរ និងសត្វព្រៃ ជាពិសេសសត្វស្លាបព្រៃ ចេញពីទ្រុងមាន់ និងចំណីមាន់។

វិធានការជីវសុវត្ថិភាពទូទៅ

- រក្សាបក្សីរបស់អ្នកនៅក្នុងបរិយាកាសសុវត្ថិភាព។
- ត្រូវប្រាកដថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបក្សីរបស់អ្នកធ្វើតាមផែនការជីវសុវត្ថិភាពទាំងអស់សម្រាប់ហ្វូងសត្វរបស់អ្នក។ អនុវត្តតាមពិធីសារជីវសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាដែលលោកអ្នកចូលទៅទីកន្លែងបសុបក្សី។
- ពាក់សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងដោយឡែកនៅពេលធ្វើការជាមួយសត្វស្លាបរបស់អ្នក។
- សម្អាតជុំវិញកំពុង និងរាងសត្វស្លាបព្រៃពីការចូលទៅទីកន្លែងជុំវិញ និងបសុបក្សី។
- មិនត្រូវឱ្យគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលកំពុងពិកន្លែងខាងក្រៅឡើយ។ បោះវាចោលទៅ!
- មិនត្រូវចូលទៅកន្លែងបសុបក្សីរបស់អ្នក ឬគ្រប់គ្រងសត្វស្លាប ឬឧបករណ៍របស់អ្នក បន្ទាប់ពីបរិច្ចាគ នេសាទ ឬមកទាក់ទងនឹងសត្វស្លាបផ្សេងទៀត ឬកន្លែងដែលបក្សីព្រមកញឹកញាប់។
- មិនត្រូវទិញសត្វស្លាបពីប្រភពដែលមិនស្គាល់ ដូចជាការដេញថ្លៃ ឬទីផ្សារបក្សីសំផ្សេងទៀត។
- ត្រូវថែរក្សាសត្វស្លាបតាមអាយុ និងសុខភាព - ក្មេងជាងគេដល់ចាស់ជាងគេ។ ដាក់ផ្ទះបក្សីឈឺដោយឡែកពីគ្នា ហើយផ្តល់ការថែទាំដល់ពួកវាចុងក្រោយ។ ជាពិសេសមនុស្សដាច់ដោយឡែក ត្រូវថែទាំបក្សីឈឺ។

ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសត្វបក្សីដែលធ្វើដំណើរដោយសេរី

អ្នកចិញ្ចឹមបសុបក្សី និងម្ចាស់សត្វស្លាបខាងក្រោយផ្ទះ ដែលចិញ្ចឹមបក្សីនៅខាងក្រៅនោះ ប្រព័ន្ធមិនបង្វែង ត្រូវតែការពារការប៉ះពាល់ជាមួយបក្សីព្រៃ ជាពិសេសសត្វស្លាបដែលរស់នៅនឹងទីកន្លែង និងលាមកបក្សីព្រៃ។

- កំណត់អត្តសញ្ញាណតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ រួមទាំងតំបន់ដីសើមតាមបណ្តោយផ្លូវហោះហើរសម្រាប់ធ្វើចំណាកស្រុក តំបន់ដែលហ្វូងសត្វព្រៃដែលរស់នៅនឹងទីកន្លែង ឬបក្សីនៅមាត់ច្រាំងប្រមូលផ្តុំ និងតំបន់ផលិតសត្វបក្សីដែលមានដងស៊ីតេខ្ពស់។
- អនុវត្តវិធានការបង្ការនៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់៖
 - ទុកបក្សីក្នុងទ្រុងតាមដែលអាចធ្វើបាន។
 - ទ្រុងបិទជិតខាងក្រៅ ត្រូវមានដំបូលរឹង និងសំណាញ់ល្អស ឬសំណាញ់ហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញ។
 - ផ្តល់ជំនី និងទឹកសម្រាប់បសុបក្សីទាំងអស់ ដែលមិនមានការបង្វែងនៅទីកន្លែងក្នុងទ្រុង។
 - ទប់ស្កាត់ការចូលទៅកាន់ព្រែក ស្រះ និងផ្ទៃទឹកផ្សេងទៀត ដែលអាចបំពុលដោយដំណាក់ទឹកសត្វស្លាបព្រៃ។
 - ដំឡើង និងប្រើស្បែកជើងកងដែលសម្លាប់មេរោគមុនពេលចូលទៅក្នុងទ្រុង ឬកន្លែងបសុបក្សីផ្សេងទៀត។ ការណ៍នេះអាចមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ដូចជាធុងទឹកដែលមានគម្របសុវត្ថិភាព និងដក់ដែលប្រើបានយូរ ដើម្បីបោសស្បែកជើងមុនពេលចូល។



មិនត្រូវដាក់លាយបក្សីរបស់អ្នកជាមួយសត្វផលិតផ្សេងទៀត!

ប្រសិនបើហ្វូងសត្វរបស់អ្នកឆ្លងមេរោគ HPAI នោះ លោកអ្នកមិនអាចផ្លាស់ទីផលិតផលទឹកនោះគេ ឬផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតបានទេ លុះត្រាតែសត្វស្លាបរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាដោយឡែក ហើយលោកអ្នកមានការអនុវត្តជីវសុវត្ថិភាពល្អនៅនឹងកន្លែង។

សូមរកមើលសញ្ញាជំងឺឆ្លង

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីដឹងពីសញ្ញាព្រមាននៃជំងឺឆ្លង ដូចជាគ្រុនផ្តាសាយបក្សី។ បក្សីដែលមានមេរោគ HPAI បង្កើតមេរោគកាន់កែច្រើនទៅតាមពេលវេលា។ ការរកឃើញទាន់ពេលវេលា ជួយការពារការរីករាលដាលជំងឺឆ្លង។ សូមរកមើលសញ្ញាទាំងនេះ៖

- ការកើនឡើងនៃការស្លាប់ដែលមិនអាចពន្យល់បាននៅក្នុងហ្វូងសត្វរបស់អ្នក ដោយមានឬគ្មានរោគសញ្ញានានា
- កណ្តាល បីតខ្យល់ ក្អក និង/ឬ ហៀរសំបោរ
- កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹក ឬចំណី
- រាគពណ៌បៃតង, រាគពណ៌ដូចទឹក
- អត់កម្លាំង ឬស្លាក់ខុសពីធម្មតា
- ធ្លាក់ចុះផលិតស៊ុត ឬសំបកទន់ ឬស្លើង ខុសរូបរាង
- ហើមជុំវិញភ្នែក ក ឬក្បាល
- ការប្រែពណ៌ស្វាយនៅក្រងក សេមាន់ និងជើង

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសត្វ
ស្លាប់ឈឺ ឬស្លាប់ សូមទាក់ទង



617-626-1795

ប្រសិនបើលោកអ្នកសង្ស័យថាមានជំងឺផ្តាសាយបក្សី

សូមកុំរង់ចាំ! ហៅទូរស័ព្ទភ្លាមៗ។ សូមរាយការណ៍ពីសត្វបក្សីឈឺ ឬស្លាប់ទៅក្រសួងធនធានកសិកម្ម ផ្នែកសុខភាពសត្វនៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត (MAss. Dept. of Agricultural Resources, AniMAI Health Division) តាមលេខ 617-626-1795, ឬតាម ទម្រង់របាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតនេះ ឬ USDA តាមលេខ 1-866-536-7593 មិនត្រូវផ្លាស់ទីបក្សីណាមួយនៅលើបរិវេណ ឬចេញពីបរិវេណរបស់អ្នកឡើយ។

បក្សីព្រៃស្លាប់ត្រូវរាយការណ៍ទៅក្រសួងនេសាទ និងហ្គេម ផ្នែកជលផល និងសត្វព្រៃ (Department of Fish and Game, Division of Fisheries and Wildlife (MAssWildlife)) ដោយប្រើទម្រង់អនឡាញដែលមាននៅ [at MAss.gov/reportbirds](https://MAss.gov/reportbirds)

ព័ត៌មានបន្ថែម

- ជីវសុវត្ថិភាព៖ ការពារហ្វូងសត្វ- USDA: <https://healthybirds.aphis.USDA.gov/>
- ជីវសុវត្ថិភាព៖ សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអាយយ៉ោវ៉ា (Iowa State University)៖ <https://poultrybiosecurity.org/>
- ការរកឃើញមេរោគ HPAI បច្ចុប្បន្ន៖ USDA: <https://www.aphis.USDA.gov/aphis/ourfocus/aniMALhealth/aniMALdisease-inforMation/avian/avian-influenza/2022-HPAI>
- គោលការណ៍ឆ្លើយតបរបស់ USDA HPAI: <https://www.aphis.USDA.gov/aphis/ourfocus/aniMALhealth/emergencyMANagement/HPAI/fadprep-HPAI>

រៀបចំដោយក្រសួងធនធានកសិកម្មរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត MAssachusetts Department of Agricultural Resources) 1-22-25 រូបភាពដែលប្រើដោយមានការអនុញ្ញាត C. Sexton។