



ការប៉ះពាល់ Cyanobacteria

បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពកើនឡើង និងភ្លៀងធ្លាក់ញឹកញាប់ ដែលបណ្តាលឱ្យហូរចូលទៅក្នុងស្រះ និងបឹង។ អាកាសធាតុក្តៅ ពន្លឺព្រះអាទិត្យ សារធាតុចិញ្ចឹមលើ សពីទឹកភ្លៀង និងទឹកដែលនៅទ្រើង ឬហូរយឺតៗផ្ទុយឱ្យ cyanobacteria (ហៅម្យ៉ាងទៀតថា សារាយខៀវបៃតង) លូតលាស់លឿន។ Cyanobacteria អាចផលិតជាតិពុល ដែលអាចធ្វើឱ្យមនុស្ស និងសត្វល្អិតបាន។

នៅពេលដែល cyanobacteria កើនឡើង ពួកវាបង្កើតជាផ្កាសារាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ និងជាវិធីយូឡូបង្កើតជាបណ្តុំមើលឃើញនឹងភ្នែក ដែលអាចបណ្តាលឱ្យទឹកប្រៃពណ៌បន្តិច មានពពកឬស្រដៀងទៅនឹងស៊ុបសណ្តែក ឬថ្នាំលាប។ មនុស្ស និងសត្វអាចប៉ះពាល់នឹង cyanobacteria ដោយការប៉ះ ផឹក ឬដកដង្ហើមចូល។ ការប៉ះពាល់អាចនាំឱ្យ មានរោគសញ្ញាក្រពះពោះវៀន កន្ទួលស្បែក រលាកភ្នែក ច្រមុះ និងបំពង់ក និងខូចសរសៃប្រសាទ ឬស្លើម។

តើអ្នកណាមានហានិភ័យខ្ពស់?

- កុមារអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំ
- មនុស្សដែលហែលទឹក ជិះទូក ជិះស្តី ជិះទូកកាយ៉ាក ឬកាណូកក្នុងបឹង ស្រះទឹកសាប និងទន្លេ។
- មនុស្សដែលមានភាពស្មុំនឹងជំងឺខ្សោយ
- សត្វចិញ្ចឹម

តើយើងអាចធ្វើអ្វីបានចំពោះវា?

- សូមរកមើលសញ្ញាព្រមានដែលដាក់នៅច្រកចូល ឬតាមផ្លូវចូលទៅ ផ្ទៃទឹក
- ដឹងថាផ្កាសារាយមានគ្រោះថ្នាក់បែបណា៖
 - ទឹកពណ៌បៃតង ឬខៀវបៃតងភ្លឺ
 - ស្រទាប់នៃពពុះ ស្រទាប់ ស្នាមពណ៌បៃតង ឬចំណុច ឬស្នាមពណ៌ដូចថ្នាំលាបលើផ្ទៃទឹក
 - ស្ថានភាពទឹកប្រឡាក់ ឬដូចស៊ុប
- មើលស្ថានភាពទឹកឱ្យបានដិតដល់ បើសង្ស័យ សូមនៅឱ្យឆ្ងាយ!
- ស្វែងរកការថែទាំសុខភាព ប្រសិនបើអ្នកប៉ះផ្កាសារាយ និងមានរោគសញ្ញាក្រពះពោះវៀន កន្ទួលស្បែក រលាកភ្នែក ច្រមុះ ឬបំពង់ក

