

接种新冠病毒疫苗后常见问题解答



疫苗是否有副作用？

- 注射部位疼痛、红肿、肿胀和/或触痛
- 疲倦
- 头痛
- 肌肉和/或关节痛
- 寒颤
- 恶心和呕吐
- 发烧



如果我出现副作用, 该怎么办？

- 在注射部位敷一块清洁的冷湿毛巾, 使用或活动注射疫苗的手臂。
- 喝大量饮料, 少穿衣服, 减少发烧造成的不适。
- 如果注射部位红肿或触痛在24小时后加剧、其他副作用在几天后未消失, 或者您感到担忧, 请与您的医生或医疗保健提供者联系。



疫苗何时开始起作用？

通常需要几周时间身体才能建立免疫力, 因此人们可能在接种疫苗前后感染新冠病毒和患新冠病毒病。



注射一剂疫苗与注射两剂疫苗相比, 效果如何？

如果您注射了强生 (Johnson and Johnson/Janssen) 疫苗, 您只需注射一剂, 即可获得全面保护。如果您注射了莫德纳 (Moderna) 或辉瑞 (Pfizer) 疫苗, 您需要注射两剂, 才能获得全面保护。



疫苗的保护作用会持续多久？

我们还没有疫苗的保护作用将持续多久的数据。

接种疫苗后, 我是否仍然需要戴口罩和避开人群？

每个人继续使用所有可用的工具阻止病毒传播十分重要。即使在您获得疫苗全面保护后, 您应当继续戴口罩、洗手、保持社交距离和避开人群。请在了解疫苗在现实生活条件下影响的过程中, 遵守所有州政府的指南。



如需了解更多信息, 请访问网站 [Mass.gov/COVIDvaccine](https://www.mass.gov/COVIDvaccine)

