

Często zadawane pytania po otrzymaniu szczepionki na COVID-19



Czy są jakieś skutki uboczne tej szczepionki (tych szczepionek)?

- Ból, zaczerwienienie, obrzęk i/lub tkliwość w miejscu wstrzyknięcia
- Zmęczenie
- Ból głowy
- Ból mięśni i/lub stawów
- Dreszcze
- Nudności i wymioty
- Gorączka



Co należy zrobić, jeśli wystąpią skutki uboczne?

- Należy przykryć miejsce iniekcji czystym, chłodnym, wilgotnym ręcznikiem i używać lub ćwiczyć ramię.
- Należy pić dużo płynów i ubierać się lekko, aby zmniejszyć dyskomfort związany z gorączką.
- Należy skontaktować się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia, jeśli zaczerwienienie lub tkliwość w miejscu wstrzyknięcia zwiększa się po 24 godzinach, jeśli inne działania niepożądane nie ustępują po kilku dniach lub w razie wystąpienia niepokojących objawów.



Kiedy szczepionka zaczyna działać?

Zwykle organizm potrzebuje kilku tygodni, aby wytworzyć odporność, dlatego możliwe jest zarażenie się i zachorowanie na COVID-19 tuż przed lub tuż po szczepieniu.



Jak skuteczna jest jedna dawka w porównaniu do dwóch?

Osoby, które otrzymały szczepionkę firmy Johnson and Johnson (Janssen), wymagają tylko jednej dawki, aby być w pełni zaszczepione. Osoby, które otrzymały szczepionkę Moderna lub Pfizer, muszą przyjąć dwie dawki, aby być w pełni zaszczepione.



Jak długo trwa ochrona po podaniu szczepionki?

Nie dysponujemy jeszcze danymi, które pozwoliłyby stwierdzić, jak długo szczepionka będzie zapewniać ochronę.

Czy po jej otrzymaniu muszę nosić maseczkę i unikać grup?



Ważne jest, aby wszyscy nadal używali wszystkich dostępnych narzędzi, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby. Nawet po pełnym zaszczepieniu należy nadal nosić maseczkę, myć ręce, zachowywać dystans i unikać grup. Należy przestrzegać wszystkich wytycznych państwowych, ucząc się wpływu szczepionek w warunkach rzeczywistych.