Perguntas frequentes após receber a vacina contra COVID-19

A vacina tem efeitos colaterais?

- **Dor, vermelhidão, inchaço e/ou sensibilidade na área da vacina**
- **Fadiga**
- **Dor de cabeça**
- **Dor muscular e/ou dor nas articulações**
- **Calafrios**
- **Náusea e vômito**
- **Febre**

O que devo fazer se sentir efeitos colaterais?

- Coloque uma toalha limpa umedecida com água gelada sobre a área da vacina e mova ou exercite o braço.
- Beba líquidos em abundância e vista-se com roupas leves para reduzir o desconforto da febre.
- Entre em contato com o seu médico ou prestador de cuidados de saúde se a vermelhidão ou sensibilidade na área da vacina aumentar após 24 horas, se outros efeitos colaterais persistirem após alguns dias ou se você estiver preocupado.

Quando a vacina começa a funcionar?

O corpo normalmente desenvolve imunidade dentro de algumas semanas, então uma pessoa pode ser infectada pela COVID-19 e ficar doente antes ou logo após a vacinação.

Qual é a eficácia de uma dose única em comparação a duas doses?

Se você recebeu a vacina da Johnson & Johnson (Janssen), você precisa de apenas uma dose para completar a imunização. Se você recebeu a vacina da Moderna ou Pfizer, precisa de duas doses para completar a imunização.

Por quanto tempo a vacina oferece proteção?

Ainda não temos dados suficientes que comprovem o período de proteção da vacina.

Devo usar máscara e evitar grupos mesmo após receber a vacina?

É importante que todos continuem usando todas as ferramentas disponíveis para interromper a propagação do vírus. Mesmo que você esteja totalmente vacinado, deve continuar a usar máscara, lavar as mãos, manter o distanciamento e evitar aglomerações. Siga todas as orientações do estado enquanto monitoramos o impacto das vacinas em condições da vida real.

Para obter mais informações, acesse **Mass.gov/COVIDvaccine**