

Preguntas frecuentes después de recibir la **vacuna contra COVID-19**



¿Hay algún efecto secundario por la vacuna?

- Dolor, enrojecimiento, hinchazón y/o sensibilidad en la zona de la inyección
- Escalofríos
- Fatiga
- Náuseas y vómitos
- Dolor de cabeza
- Fiebre
- Dolor muscular y/o articular



¿Qué debo hacer si experimento efectos secundarios?

- Aplíquese un paño limpio, frío y húmedo sobre la zona de la inyección, y use o ejercite el brazo.
- Beba abundantes líquidos y use ropa liviana para reducir la molestia de la fiebre.
- Comuníquese con su médico o proveedor de atención médica si el enrojecimiento o la sensibilidad en la zona de la inyección aumenta después de 24 horas, si otros efectos secundarios no desaparecen después de unos días o si tiene inquietudes.



¿Cuándo empieza a funcionar la vacuna?

El organismo normalmente tarda algunas semanas en desarrollar inmunidad, de modo que es posible que una persona pudiera infectarse y enfermarse de COVID-19 justo antes o inmediatamente después de la vacunación.



¿Cuál es la eficacia de una dosis en comparación con dos dosis?

Si recibió la vacuna de Johnson and Johnson (Janssen), solo necesita una dosis para estar completamente vacunado. Si recibió la vacuna de Moderna o la de Pfizer, necesita dos dosis para estar completamente vacunado.

¿Cuándo dura la protección de las vacunas?

No tenemos información aún para decir por cuánto tiempo la vacuna brinda protección.



¿Tengo que usar una mascarilla y evitar grupos aún después de vacunarme?

Es importante que todos sigan usando todas la herramientas disponibles para detener la propagación. Incluso después de estar completamente vacunado debe seguir usando una mascarilla, lavándose las manos, manteniendo su distancia y evitando grupos. Siga todas las guías del estado mientras obtenemos más información sobre el impacto de las vacunas en condiciones reales.

