

年龄为五岁以下儿童接触肺结核细菌后 如何保持健康：

家长须知

肺结核 (TB) 是通过空气传播的。如果您接触了肺结核患者,那么就有可能吸入了导致肺结核的病菌。如果年龄未满 5 岁的儿童吸入肺结核病菌,孩子可能很快就会生病。

咳嗽或发烧
2-3 周或更长时间



感到恶心、
虚弱或疲倦



没有平时
那么喜欢玩耍



不吃饭或
母乳喂养不好



我怎么做才能
让自己的孩子
能保持健康?



我怎么做才能让自己的孩子能保持健康?

如果您发现自己的孩子接触过肺结核患者,请联系您当地的公共卫生部门,帮助孩子获得需要的医护服务。检查和治疗可以帮助保持您孩子的健康。

您应该带孩子去医疗机构做体检、拍胸部 X 光并做肺结核皮肤检查或肺结核血液化验。即使您孩子的检测结果呈阴性,医生也可能推荐药物。

我孩子的肺结核检查结果是阴性,为什么医生还建议药物?

如果您的孩子接触了肺结核病菌,最长需要两个月的时间肺结核检查结果才会是阳性。请一定要让您孩子的身体有足够的时间表现孩子是否感染了肺结核病菌。如果孩子第一次肺结核检查结果是阴性,可能需要在几周后再做一次检查。

在孩子等待做第二次检查期间,可以给孩子服用一些起保护作用的药物。这种治疗称为 Window Preventive Treatment。年龄未满 5 岁的幼儿更可能因为感染肺结核病菌很快生病,所以尽早采取保护措施非常重要。

接受肺结核 Window Preventive Treatment 时,我的孩子会有什么样的感觉?

大多数儿童对肺结核药物没有异常反应。如果有任何让您担心的症状,请联系您孩子的医生。

做完第二次肺结核检查会发生什么情况?

做完第二次检查后,您孩子的医生会确诊孩子要不要继续用药。