

ការក្បាច់ៗអាយុក្រោមប្រាំឆ្នាំ ឲ្យមានសុខភាពល្អ បន្ទាប់ពីឆ្លងជំងឺរបេង៖ អ្វីៗដែលមាតាបិតាត្រូវដឹង

ជំងឺរបេង (Tuberculosis, TB) ឬហៅសង្ខេបថា របេង ឆ្លងរាលដាលតាមខ្យល់អាកាស។ អ្នកអាចដកដង្ហើមចូលមេធាត ដែលបណ្តាលឲ្យមានរបេង បើសិនអ្នកចំណាយពេលជាមួយជនណាម្នាក់ ដែលមានជំងឺរបេង។ បើសិនក្មេងអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំ ដកដង្ហើមចូលមេធាតរបេង គេអាចនឹងឈឺថ្នាត់ឆាប់រហ័សណាស់។


ការក្អក ឬការមានគ្រុនក្តៅ
ចំនួន 2-3 អាទិត្យ ឬយូរជាង



ការឈឺថ្នាត់ ខ្សោយ
កំឡាំង ឬអស់កំឡាំង




មិនសូវលេង
ខុសពីធម្មតា



មិនញ៉ាំអាហារ
ឬមិនមិនល្អ



ការស្រកទំងន់
ឬមិនឡើងទំងន់



តើខ្ញុំអាចរក្សាកូនរបស់ខ្ញុំ ឲ្យមានសុខភាពល្អដូចម្តេច?

បើសិនអ្នកបានដឹង ថាកូនរបស់អ្នកបានទាក់ទងជាមួយជនណាម្នាក់ដែលមានរបេង ត្រូវទាក់ទងទៅក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈ តាមតំបន់របស់អ្នក ដើម្បីជួយកូនរបស់អ្នក ឲ្យបានការថែទាំដែលគេត្រូវការ។ ការធ្វើតេស្ត និងការព្យាបាល អាចជួយរក្សាកូនរបស់អ្នក ឲ្យមានសុខភាពល្អ។

កូនរបស់អ្នក គួរតែជួបអ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាព ដើម្បីពិនិត្យរូបកាយ ថតអិក្សេស្កូត និងដោះស្រាយធ្វើតេស្តរបេង ឬយកឈាមធ្វើតេស្តរបេង។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក អាចនឹងឲ្យអនុសាសន៍ប្រើថ្នាំ សូម្បីតែបើការធ្វើតេស្តនៃកូនរបស់អ្នក គឺជាអវិជ្ជមានក៏ដោយ។

តើហេតុអ្វីត្រូវបានឲ្យអនុសាសន៍ប្រើថ្នាំ បើសិនការធ្វើតេស្តរបេងនៃកូនរបស់ខ្ញុំ គឺជាអវិជ្ជមាន?

វាអាចប្រើពេលដល់ទៅពីរខែ សំរាប់ការធ្វើតេស្តរបេងក្លាយជាវិជ្ជមាន បន្ទាប់ពីកូនរបស់អ្នកបានឆ្លងមេធាតរបេង។ វាគឺជាសារៈសំខាន់ ដើម្បីឲ្យរូបកាយនៃកូនរបស់អ្នក មានពេលគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបង្ហាញថាតើគេបានដកដង្ហើមចូល មេធាតរបេងឬអត់។ បើសិនការធ្វើតេស្តរបេងដំបូងរបស់គេ គឺជាអវិជ្ជមាន កូនរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវការធ្វើតេស្តលើកទីពីរ ក្នុងពេលពីរបីអាទិត្យ។

មានថ្នាំពេទ្យ ដើម្បីការពារកូនតូចៗរបស់អ្នក ខណៈគេកំពុងរង់ចាំសំរាប់ការធ្វើតេស្ត លើកទីពីររបស់គេ។ ការព្យាបាលនេះគឺហៅថា Window Preventive Treatment។ កូនក្មេងៗអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំ គឺទំនងនឹងឈឺថ្នាត់ដោយសារជំងឺរបេង ឆាប់រហ័សណាស់ ម្ល៉េះហើយការការពារដោយរូសាន់ នៅអំឡុងរយៈពេលបង្អួចនេះ គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់។

តើកូនរបស់ខ្ញុំនឹងយ៉ាងណា ខណៈលេបថ្នាំរបេង Window Preventive Treatment?

ក្មេងៗភាគច្រើន ទ្រាំទ្រនឹងថ្នាំរបេងបានល្អណាស់។ បើសិនគេមានធាតុសញ្ញាអ្វីមួយ ដែលជាកង្វល់ដល់អ្នក សូមប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតនៃកូនរបស់អ្នក។

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តរបេងលើកទីពីរ?

បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តលើកទីពីរ វេជ្ជបណ្ឌិតនៃកូនរបស់អ្នក នឹងសំរេចបើសិនគេត្រូវបន្តលេបថ្នាំទៀត។