



预防养狗设施中的疾病

狗狗日托中心、寄宿设施、犬舍和宠物美容店的生物安全实践

通过制定强有力的疫苗接种和生物安全要求，防止疾病传入设施。

预防疾病接触

1. 询问健康状况，排除患病动物。

- 工作人员应在接收前询问狗的健康状况。““小狗”最近感觉怎么样？”
- 工作人员应观察动物是否有疾病迹象（咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、呕吐、腹泻、没有精神）。表现出疾病迹象的动物不得进入设施。这些动物在进入设施前应接受兽医的检查。将本政策通知客户。



2. 防止疾病的蔓延

- 当受感染的动物或其体液（粪便、尿液、咳嗽/打喷嚏产生的液体、唾液等）与另一只动物接触时，就会发生疾病传播。被体液污染的材料，如寝具、玩具、看护人的手、衣服、鞋子等，也会带来同样的风险。
- 出现疾病迹象的动物应转移到不接触其他动物的区域。患病的动物必须立即离开设施。准备一个备用计划，以防主人不能马上接走动物。患病的动物应接受兽医的检查。
- 有一个专门的区域来隔离生病的动物。在患病动物区使用专用设备（盆、玩具、寝具、清洁用品等）。在动物离开设施后以及从该区域移除任何设备之前，对该区域和设备进行彻底地清洁和消毒。

3. 减少混合和交叉污染

- 将不同分组的动物分开安置（例如，根据动物的体型或性情分组）。为每组动物设置专用区域，为每个动物安置区设置专用设备。
- 员工应在接触狗之后以及在接触不同动物组之间时用肥皂和温水洗手。
- 在将不同的动物移入动物区域之前，对动物区域进行清洁和消毒。

接种疫苗

- 当疾病接触的风险因混合而增加时，接种疫苗在预防狗的疾病方面非常有效。设施所有者和管理者应与兽医讨论建议的疫苗接种要求（包括频率）。
- 确保进入该设施的任何犬只都有当前的狂犬病疫苗和适当的狗证。
- 值得关注的犬类疾病包括：犬瘟热、1型和2型犬腺病毒、犬细小病毒、副流感、波德特氏菌、H3N8型流感、H3N2型流感和钩端螺旋体病。



日常清洁消毒预防疾病传播

1. 动物棚舍、玩耍区、玩具以及用于喂养和饮水的设备应每天或根据需更频繁地进行清洁。
2. 动物粪便应迅速清理干净，然后以防止其他动物接触的方式处理。
3. 用品应存放在远离动物区的的地方，或存放在易于清洁和消毒的容器中。
4. 肮脏或布满灰尘的表面、未密封的木头、有划痕或生锈的表面很难清洁和消毒，并且可能藏有致病微生物。清除蛛网和灰尘堆积物。清洁有污渍的表面。给刮伤或裸露的木头刷上油漆或将其密封。修理、更换生锈的金属或为其涂上油漆。



清洁和消毒说明

1. 将所有动物从需要清洁和消毒的区域移走。应将动物转移到已经清洁和消毒的笼子/区域。
2. 干洗：清除待清洁和消毒表面的粪便、毛皮、污物、树叶、草等。
3. 湿法清洁：用肥皂和温水刷洗，然后晾干。
4. 消毒：速效过氧化氢（AHP）产品似乎比其他消毒剂（如漂白剂）更安全、更有效。按照所有标签说明使用选定的消毒剂。注意安全预防措施、表面类型、接触时间、稀释和储存。不要将不同的消毒剂混合。
5. 冲洗并晾干该区域。潮湿的地方很难消毒。



防止疾病在您护理的犬中传播。要求接种常见的传染病疫苗，不允许患病的动物进入您的设施，保持单独的分组，每天清洁和消毒区域和设备。



如果您有任何疑问、担忧，或需要报告疾病爆发，
请致电Massachusetts州农业资源部
动物卫生部门，电话：617-626-1795。