

Оспа обезьян



Важные факты: Каждый может заболеть оспой обезьян (МРОХ). Обычно она распространяется при близком телесном и половом контакте. Заражение оспой обезьян можно предотвратить.

Пройдите проверку

Сообщите своему лечащему врачу или в местный медицинский центр о высыпаниях или поражениях на теле, новых или неясной этиологии, включая руки, ноги, лицо, половые органы и задний проход.

Пройдите тестирование

Тестирование можно пройти у своего лечащего врача или в местном медицинском центре.

Пройдите лечение

Если у вас диагностирована оспа обезьян, узнайте о вариантах лечения.

Пройдите вакцинацию

Узнайте, нет ли противопоказаний к вакцинации. Поставки вакцин осуществляются в первую очередь для тех, кто в настоящее время подвергается наибольшему риску, и для сообществ, в которых распространяется вирус.



Оспа обезьян чаще всего распространяется при тесном физическом контакте, например:

- телесном контакте с сыпью; струпьями или биологическими жидкостями;
- половом контакте;
- другом тесном контакте, таком как поцелуи, массаж или объятия.



В некоторых случаях оспа обезьян также может передаваться:

- воздушно-капельным путем при длительном тесном контакте без маски;
- при совместном использовании полотенец, постельного белья, одежды или других личных вещей;
- при совместном употреблении напитков, использовании столовых приборов, сигарет, вейпов, кальянов.



Вероятность распространения оспы обезьян сводится к минимуму при соблюдении следующих рекомендаций:

- исключение продолжительного тесного контакта, а также ношение закрытой одежды в случае скопления людей;
- сокращение или избегание рукопожатий;
- совершение покупок в торговых центрах или крупных супермаркетах.

Найдите ближайшие пункты вакцинации на сайте:
mass.gov/MonkeypoxVaccine



Massachusetts
Department of
Public Health