

Ju keni bërë **Johnson & Johnson (Janssen)** vaksinën

Informacion i rëndësishëm për ata që bëjnë vaksinën e COVID-19

Faleminderit që bëtë vaksinën e COVID-19. Ju jeni pjesë e rëndësishme e pjekjes tonë për të ndalur përhapjen dhe për të ruajtur komunitetet tona.

Nuk jeni ende plotësisht i/e vaksinuar!

Ju nuk do të jeni plotësisht i/e vaksinuar deri në dy javë pasi keni bërë vaksinën Johnson & Johnson. Deri atëherë, përsëri mund ta merrni dhe përhapni COVID-19. Vazhdoni të merrni masat mbrojtëse për të ulur përhapjen.



Lani duart



Mbani maskë



Ruani distancën



Shmangni grupet

Jo të gjithë vaksinohen kur vaksinoheni ju. Ndërsa e dimë se ajo ul shumë rastet dhe simptomat, ne jemi ende duke mësuar rreth mbrojtjes së vaksinës kundër COVID-19 në kushtet jetësore.

Shumë njerëz përjetojnë efekte anësore të vogla, efektet anësore të rënda janë të rralla

Efektet anësore të rënda nga vaksinat, përfshi vaksinën e COVID-19, janë të rralla. Efektet anësore më të zakonshme janë të vogla, përfshi:

- Dhimbje në vendin e injeksionit
- Dhimbje muskujsh dhe/ose e kyçeve
- Dhimbje koke
- Lodhje
- Ethe
- Temperaturë

Këto efekte anësore mund të zgjasin disa ditë por nuk janë shkak për alarm. Në se vazhdon dhimbja në vendin e injeksionit ose jeni i/e shqetësuar, kontaktoni mjekun. Në se nuk keni mjek parësor ose doni të raportoni efektet anësore në CDC, vizitoni [cdc.gov/vsafety](https://www.cdc.gov/vsafety)

Merrni ndihmën mjekësore menjëherë në se keni ndonjë nga simptomat e mëposhtme brenda tri javëve pas marrjes së vaksinës COVID-19 të Johnson & Johnson:

- Dhimbje koke të forta ose sy të mjegulluar
- Dhimbje gjoksi
- Dhimbje zorrësh që nuk largohet
- Marrje fryme
- Ënjtje të këmbëve
- Mavijosje ose pika të imta gjaku nën lëkurë