

# 您接种了强生 (Johnson & Johnson/Janssen) 疫苗

## 向注射新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的人发出的重要信息

感谢您注射新冠病毒疫苗。您是我们阻止病毒传播并维护社区安全的重要组成部分。

### 您尚未获得全面疫苗保护！

您要在接种强生疫苗两周后才能获得全面疫苗保护。在此之前，您仍然会感染和传播新冠病毒。请继续保持减少病毒传播的习惯。



洗手



戴口罩



保持距离



避开人群

当您接种疫苗时，并非每个人都已接种疫苗。尽管我们知道疫苗将极大地减轻症状，但我们仍然在了解疫苗在现实生活条件下对预防新冠病毒感染的保护作用。

### 很多人会出现轻微的副作用， 但严重副作用很罕见

疫苗 (包括新冠病毒疫苗) 严重副作用很罕见。大多数常见副作用很轻微，其中包括：

- 注射部位疼痛
- 肌肉痛和/或关节痛
- 头痛
- 疲倦
- 寒颤
- 发烧

这些副作用可能持续几天，但无需惊慌。如果注射部位疼痛持续或者您感到担忧，请与您的医生联系。如果您没有初级保健医生或者希望向疾病控制与预防中心 (CDC) 报告任何副作用，请访问网站 [cdc.gov/vsafe](https://www.cdc.gov/vsafe)。

如果您在接种强生新冠病毒疫苗三周后出现以下任何症状，请立即就医：

- 剧烈头痛或视力模糊
- 胸痛
- 持续腹痛
- 呼吸急促
- 腿部肿胀
- 容易擦伤或皮下小血点

如需了解更多详情，请访问网站 [Mass.gov/COVIDvaccine](https://www.mass.gov/COVIDvaccine)。

