

Otrzymał(-a) Pan(i) szczepionkę **Johnson & Johnson (Janssen)**

Ważne informacje dla osób otrzymujących szczepionkę COVID-19

Dziękujemy za zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Przyczynia się Pan(i) do naszych wysiłków zmierzających w kierunku powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby i zapewnienia bezpieczeństwa naszym społecznościom.

Nie jest Pan(i) jeszcze w pełni zaszczepiony!

Nie będzie Pan(i) w pełni zaszczepiony(-a) do dwóch tygodni po otrzymaniu szczepionki Johnson and Johnson. Do tego czasu, nadal może Pan(i) zarazić się i rozprzestrzeniać COVID-19. Należy kontynuować praktykowanie nawyków ograniczających rozprzestrzenianie się choroby.



Myć ręce



Nosić maseczkę



**Utrzymywać dystans
od innych**



Unikać grup

Nie wszyscy zostaną zaszczepieni w tym samym czasie co Pan(i). I chociaż wiemy, że szczepionka znacznie zmniejsza objawy, wciąż uczymy się, jak chroni nas przed COVID-19 w rzeczywistych warunkach.

U wielu osób występują lekkie działania niepożądane, ale poważne skutki uboczne są rzadkie.

Poważne działania niepożądane po podaniu szczepionek, w tym szczepionki przeciw COVID-19, występują rzadko. Najczęstsze działania niepożądane są nieznaczne i obejmują:

- Ból w miejscu wstrzyknięcia
- Bóle mięśni i stawów
- Bóle głowy
- Uczucie zmęczenia
- Dreszcze
- Gorączkę

Te działania niepożądane mogą utrzymywać się przez kilka dni, ale nie stanowią powodu do niepokoju. Jeśli ból w miejscu wstrzyknięcia utrzymuje się lub jeśli jest Pan(i) zaniepokojony(-a), należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli nie ma Pan(i) lekarza pierwszego kontaktu lub chce Pan(i) zgłosić wszelkie działania niepożądane do CDC, należy odwiedzić stronę [cdc.gov/vsafety](https://www.cdc.gov/vsafety)

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych objawów w ciągu trzech tygodni po otrzymaniu szczepionki Johnson & Johnson COVID-19 należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

- Silny ból głowy lub niewyraźne widzenie
- Ból w klatce piersiowej
- Ból jelit, który nie ustępuje
- Dusznosci
- Obrzęk nóg
- Łatwe powstawanie siniaków lub drobnych plamek krwi pod skórą