Quý vị đã chủng ngừa vắc-xin của Johnson & Johnson (Janssen)

Thông tin quan trọng cho những người chủng ngừa COVID-19

Cảm ơn quý vị đã chủng ngừa COVID-19. Quý vị là một phần quan trọng trong quá trình ngăn chặn sự lây lan và bảo vệ cộng đồng của chúng ta.

Quý vị chưa được chủng ngừa đầy đủ!

Chỉ khi sau hai tuần quý vị đã tiêm vắc-xin Johnson and Johnson thì quý vị mới chủng ngừa đầy đủ. Trong thời điểm đó, quý vị vẫn có thể bị nhiễm và lây lan COVID-19. Hãy tiếp tục những thói quen làm giảm sự lây lan.



Rửa tay



Đeo khẩu trang



Giữ khoảng cách



Tránh các nhóm

Không phải ai cũng được chủng ngừa cùng lúc với quý vị. Và dù chúng tôi biết những điều này đang làm giảm các triệu chứng, chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về khả năng bảo vệ của vắc-xin chống lại COVID-19 trong điều kiện thực tế.

Nhiều người gặp các tác dụng phụ nhẹ, các tác dụng phụ nặng rất hiếm

Rất hiếm bị các tác dụng phụ nặng từ chủng ngừa, kể cả chủng ngừa COVID-19. Các tác dụng phụ phổ biến nhất thường nhẹ và bao gồm:

- **Đau nhức tại chỗ tiêm**
- **Đau cơ và/hoặc đau khớp**
- **Nhức đầu**
- **Mệt mỏi**
- **Ớn lạnh**
- **Sốt**

Những tác dụng phụ này có thể kéo dài vài ngày nhưng không phải là nguyên nhân đáng lo ngại. Nếu chỗ tiêm vẫn còn đau hoặc quý vị lo lắng, hãy liên lạc với bác sĩ của mình. Nếu quý vị không có dịch vụ chăm sóc y tế chính hoặc muốn báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nào cho CDC, hãy vào trang web: cdc.gov/vsafe

Hãy đi gặp bác sĩ ngay nếu quý vị bị bất kỳ triệu chứng nào sau đây trong vòng ba tuần sau khi chủng ngừa COVID-19 bằng thuốc Johnson & Johnson:

- **Nhức đầu dữ dội hoặc bị mờ mắt**
- **Đau lòng ngực**
- **Đau ruột mà không ngưng giảm**
- **Hụt hơi**
- **Sưng chân**
- **Dễ bị bầm tím hoặc bị đốm máu nhỏ dưới da**

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang web: Mass.gov/COVIDvaccine