

# Ju keni bërë vaksinën **Pfizer**

## Informacion i rëndësishëm për ata që bëjnë vaksinën e COVID-19

Faleminderit që bëtë vaksinën e COVID-19. Ju jeni pjesë e rëndësishme e përpjekjes tonë për të ndaluar përhapjen dhe për të ruajtur komunitetet tona.

### Nuk jeni ende plotësisht i/e vaksinuar!

Ju duhet të merrni dozën e dytë që të jeni plotësisht të vaksinuar. Deri atëherë, përsëri mund ta merrni dhe përhapni COVID-19. Midis dozave dhe pas dozës së dytë, vazhdoni të praktikoni rregullat për të ulur përhapjen.



**Lani duart**



**Mbani maskë**



**Ruani distancën**



**Shmangni rupimet**

Jo të gjithë vaksinohen kur vaksinoheni ju. Ndërsa dimë se ajo ul shumë simptomat, ne ende po mësojmë për mbrojtjen e vaksinës kundër COVID-19 në kushtet jetësore.

### Regjistrohuni për dozën e dytë të **PFIZER**

Lini orar ose konfirmoni se si do të merrni dozën e dytë përpara se të largoheni nga vizita e parë

- Doza e dytë do të jepet të paktën 21 ditë pasi keni marrë dozën e parë.
- Vaksinohuni në të njëjtin vend si dhe me dozën e parë.
- Për dozën e dytë duhet të merrni të njëjtën vaksinë

### Mund të përjetoni efekte anësore të vogla, efektet anësore të rënda janë të rralla

Efektet anësore të rënda nga vaksinat, përfshi vaksinën e COVID-19, janë të rralla. Efektet anësore më të zakonshme janë të vogla, përfshi:

- |                                   |                               |                |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| • Dhimbje në vendin e injeksionit | • Dhimbje muskujsh/ose kyçeve | • dhimbje koke |
| • Lodhje                          | • Ethe                        | • temperaturë  |

Këto efekte anësore mund të zgjasin disa ditë por nuk janë shkak për alarm. Në se dhimbja në vendin e injeksionit vazhdon ose ndjeheni të shqetësuar, kontaktoni mjekun. Në se nuk keni mjek parësor ose doni të raportoni efektet anësore në CDC, vizitoni [cdc.gov/vsafety](https://www.cdc.gov/vsafety)

