

لقد تلقيت لقاح فايزر

معلومات مهمة للأشخاص الذين يتلقون لقاح كوفيد-19

نشكرك على تلقي لقاح كوفيد-19. أنت جزء مهم من مجهوداتنا المبذولة لوقف انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة مجتمعاتنا.

أنت لم تتلق تطعيمًا كاملًا بعد!

أنت بحاجة إلى الحصول على جرعة ثانية لتكون قد حصلت على تطعيم كامل. حتى ذلك الحين، ستظل هناك احتمالية لالتقاطك فيروس كوفيد-19 ونشره. بين الجرعات وبعد جرعتك الثانية، استمر في ممارسة عادات للحد من انتشار الفيروس



تجنب المجموعات



حافظ على مسافة معيَّنة



ارتد قناعًا



اغسل يديك

لن يكون الجميع قد تلقوا اللقاح عندما تحصل أنت عليه. وبينما نعرف أن ذلك من شأنه أن يحد بشكل كبير من الأعراض، فنحن لا زلنا نتعرف على الحماية التي يوفرها اللقاح فيما يتعلق بالتقاط فيروس كوفيد-19 في ظروف الحياة الواقعية.

سجل للحصول على جرعة فايزر الثانية

حدد موعدًا أو أكد كيفية تحديد موعد جرعتك الثانية قبل مغادرة موعدك الأول

- ينبغي تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من جرعتك الأولى على الأقل.
- تلقّ اللقاح في المكان نفسه الذي تلقيت فيه جرعتك الأولى.
- ينبغي أن تتلقى اللقاح نفسه لجرعتك الثانية

قد تشعر بأعراض جانبية طفيفة، فالأعراض الجانبية الخطيرة نادرة

الأعراض الجانبية الخطيرة الناتجة عن تلقي اللقاحات، بما في ذلك، لقاح كوفيد-19، نادرة. أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا طفيفة وتشمل:

- ألم عند موضع الحقن
- ألم العضلات و/أو ألم المفاصل
- صداع
- تعب
- قشعريرة
- حمّى

هذه الأعراض الجانبية قد تستمر لعدة أيام ولكنها ليست مدعاة للقلق. إذا استمر الألم عند موضع الحقن أو شعرت بالقلق، فاتصل بطبيبك. إذا كنت لا تمتلك رعاية أولية أو ترغب في الإبلاغ عن أي أعراض جانبية إلى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يرجى زيارة [cdc.gov/vsafe](https://www.cdc.gov/vsafe)



للمزيد من المعلومات يرجى زيارة [Mass.gov/COVIDvaccine](https://www.mass.gov/COVIDvaccine)