您注射了辉瑞（Pfizer）疫苗

向注射新冠病毒（COVID-19）疫苗的人发出的重要信息

感谢您注射新冠病毒疫苗。您是我们阻止病毒扩散并维护社区安全的重要组成部分。

您尚未获得全面疫苗保护！

您需要注射第二剂疫苗，才能获得全面疫苗保护。在此之前，您仍然会感染和传播新冠病毒。在注射两剂疫苗之间和注射第二剂疫苗后，请继续保持减少病毒传播的习惯。

洗手

戴口罩

保持距离

避开人群

当您注射疫苗时，并非每个人都将注射疫苗。尽管我们知道疫苗将极大地减轻症状，但我们仍然在了解疫苗在现实生活条件下对预防新冠病毒感染的保护作用。

请登记注射第二剂辉瑞（PFIZER）疫苗

在注射第一剂疫苗时安排或确认如何预约第二剂疫苗注射。

- **您应当在第一剂疫苗注射后至少等候21天再注射第二剂疫苗。**
- **在注射第一剂疫苗相同的地点注射第二剂疫苗。**
- **第二剂疫苗必须与第一剂疫苗相同。**

您可能出现轻微的副作用，严重副作用很罕见

疫苗（包括新冠病毒疫苗）严重副作用很罕见。大多数常见副作用很轻微，其中包括：

- **注射部位疼痛**
- **肌肉痛和/或关节痛**
- **头痛**
- **疲倦**
- **寒颤**
- **发烧**

这些副作用可能持续几天，但无需惊慌。如果注射部位疼痛持续或者您感到担忧，请与您的医生联系。如果您没有初级保健医生或者希望向疾病控制与预防中心（CDC）报告任何副作用，请访问网站cdc.gov/vsafe。

如需了解更多详情，请访问网站 Mass.gov/COVIDvaccine。