

Você recebeu a vacina da Pfizer

Informações importantes para quem está recebendo a vacina para COVID-19

Obrigado por se vacinar contra a COVID-19. Você é uma parte importante de nosso esforço para impedir a propagação da doença e manter a segurança das nossas comunidades.

Você não está totalmente imunizado!

Você precisa receber a segunda dose da vacina para completar a imunização. Antes de tomá-la, você ainda pode contrair e propagar a COVID-19. Entre as duas doses e após a segunda dose, continue a praticar hábitos que ajudam a reduzir a propagação.



Lave as mãos



Use máscara



Mantenha o distanciamento



Evite aglomerações

Nem todos serão vacinados ao mesmo tempo que você. E, embora já saibamos que ela reduz drasticamente os sintomas, ainda estamos aprendendo sobre a proteção que a vacina fornece contra a COVID-19 em condições da vida real.

Inscriva-se para receber a segunda dose da vacina PFIZER

Aproveite para agendar ou se informar sobre como marcar a consulta para a segunda dose durante a primeira consulta de vacinação.

- A sua segunda dose deve ser administrada ao menos 21 dias após a primeira dose.
- Tome a segunda dose no mesmo estabelecimento em que tomou a primeira.
- Na segunda dose, você deve receber a mesma vacina

É possível sentir efeitos colaterais leves. Efeitos colaterais graves são raros

Efeitos colaterais graves de vacinas, incluindo a vacina para COVID-19, são raros. Os efeitos colaterais mais comuns são leves e incluem:

- Dor no local da injeção
- Cansaço
- Dor muscular e/ou dor nas articulações
- Calafrios
- Dor de cabeça
- Febre

Esses efeitos colaterais podem durar vários dias, mas não são motivo de alarme. Se a dor no local da injeção persistir ou se você estiver preocupado, entre em contato com o seu médico. Se você não tiver um médico primário ou desejar informar seus efeitos colaterais ao CDC, acesse [cdc.gov/vsafe](https://www.cdc.gov/vsafe)

Para obter mais informações, acesse [Mass.gov/ COVIDvaccine](https://www.mass.gov/COVIDvaccine)

