

Quý vị đã được tiêm **vắc-xin** Pfizer

Thông tin quan trọng cho những người tiêm vắc-xin ngừa COVID-19

Cảm ơn quý vị đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Quý vị là một phần quan trọng trong quá trình ngăn chặn sự lây lan và bảo vệ cộng đồng của chúng ta.

Quý vị chưa được tiêm ngừa đầy đủ!

Quý vị cần phải tiêm liều thứ hai để tiêm ngừa đầy đủ. Đến lúc đó, quý vị vẫn có thể bị nhiễm và lây lan COVID-19. Giữa các liều và sau liều thứ hai, quý vị nên tiếp tục thói quen làm giảm sự lây lan.



Rửa tay



Đeo khẩu trang



Giữ khoảng cách



Tránh các nhóm

Không phải ai cũng được tiêm ngừa cùng lúc với quý vị. Và dù chúng tôi biết những điều này đang làm giảm các triệu chứng, chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về khả năng bảo vệ của vắc-xin chống lại sự nhiễm COVID-19 trong điều kiện thực tế.

Đăng ký liều PFIZER thứ hai của quý vị

Lên lịch hoặc xác nhận cách làm hẹn cho liều thứ hai trước khi rời lần hẹn đầu tiên

- Quý vị phải tiêm liều thứ hai trong vòng 21 ngày sau khi tiêm liều thứ nhất.
- Tiêm vắc-xin tại địa điểm nơi quý vị nhận liều đầu tiên.
- Quý vị phải nhận được cùng một loại vắc-xin cho liều thứ hai

Quý vị có thể bị tác dụng phụ nhẹ, hiếm bị tác dụng phụ nặng

Các tác dụng phụ nặng từ tiêm ngừa vắc-xin, kể cả vắc-xin ngừa COVID-19 đều rất hiếm. Các tác dụng phụ phổ biến nhất thường nhẹ và bao gồm:

- Đau nhức tại nơi được tiêm
- Đau cơ và/hoặc đau khớp
- Nhức đầu
- Mệt mỏi
- Ớn lạnh
- Sốt

Những tác dụng phụ này có thể kéo dài vài ngày nhưng không phải là nguyên nhân đáng lo ngại. Nếu nơi được tiêm vẫn còn đau hoặc quý vị lo lắng, hãy liên lạc với bác sĩ. Nếu quý vị không có dịch vụ chăm sóc y tế chính hoặc muốn báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nào cho CDC, hãy vào trang web: [cdc.gov/vsafe](https://www.cdc.gov/vsafe)

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang web: [Mass.gov/COVIDvaccine](https://www.mass.gov/COVIDvaccine)

