

PROTOCOLO DA RAIVA

MANEJO DE CÃES E GATOS EXPOSTOS À VIDA SELVAGEM

(Guaxinim, gambá, raposa, morcego, marmota ou qualquer animal selvagem carnívoro)

Categoria de Exposição	Se o Cão ou Gato está Atualmente ou Não Vacinado	Se o cão ou gato não for vacinado
Categoria 1 Contato direto ou mordida visível de um animal raivoso confirmado (inclui comer vísceras)	<ol style="list-style-type: none">1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais2. Reforço Imediato3. Confinamento Rigoroso por 45 dias	<ol style="list-style-type: none">1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais2. Eutanasiar ou se o proprietário não quiser:<ol style="list-style-type: none">a. Vacinar imediatamenteb. Isole por 3 meses, seguido de 1 mês de confinamento estrito
Categoria 2 Contato direto ou mordida visível de um animal suspeito de raiva que não está disponível para testes (inclui comer vísceras)	<ol style="list-style-type: none">1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais2. Reforço Imediato3. Confinamento Rigoroso por 45 dias	<ol style="list-style-type: none">1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais2. Eutanasiar ou se o proprietário não quiser:<ol style="list-style-type: none">a. Vacinar imediatamenteb. Confinamento Rigoroso por 4 meses
Categoria 3 Ferida de origem desconhecida suspeita de ser causada por outro animal (por exemplo, abscessos em gatos)	<ol style="list-style-type: none">1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais2. Reforço Imediato3. Confinamento Rigoroso por 45 dias	<ol style="list-style-type: none">1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais2. Eutanasiar ou se o proprietário não quiser:<ol style="list-style-type: none">a. Vacinar imediatamenteb. Confinamento Rigoroso por 4 meses
Categoria 4 Exposição por proximidade vista perto ou nas proximidades de um animal raivoso confirmado (sem contato ou feridas)	<ol style="list-style-type: none">1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais2. Reforço Imediato3. Confinamento Rigoroso por 45 dias	<ol style="list-style-type: none">1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais2. Vacinar imediatamente3. Confinamento Rigoroso por 4 meses

- Sempre usar luvas ao manusear feridas ou peles contaminadas com saliva.
- Sempre informar o proprietário sobre o risco de raiva.
- Os veterinários devem informar o inspetor de animais local sobre quaisquer casos potenciais de contato com raiva observados em seus consultórios.

1. "Não Vacinado Atualmente" significa que há prova de que o animal recebeu uma vacinação antirrábica em algum momento antes, mas a duração para a qual a vacina era boa foi excedida.
2. "Não vacinado" significa que o animal nunca recebeu uma vacina contra a raiva, ou o primeiro tiro foi administrado há menos de 28 dias.
3. Cão ou gato deve ser examinado por um veterinário para garantir que não haja feridas

Este documento foi preparado pelo Departamento de Recursos Agrícolas de Massachusetts, Divisão de Saúde Animal

Revisão: 1-ago-16

Perguntas? (617) 626-1810