

Esta tarjeta explica cómo preparar dosis de **emergencia** de

# Doxiciclina

*Para bebés y niños que han sido expuestos al ántrax*

*Una vez que las autoridades federales, estatales o locales le hayan notificado que usted ha sido expuesto al ántrax, puede ser necesario preparar algunas dosis de emergencia de doxiciclina para bebés y para niños utilizando pastillas de doxiciclina.*

**Usted va a necesitar:**

- Una (1) pastilla de doxiciclina de 100 miligramos (mg)
- Una cucharita de metal
- Cucharas de medir [1 cucharadita; y ½ cucharadita]

*(NOTA: Es preferible usar cucharas de medir, pero si no las tiene utilice una cucharita de metal para moler, medir y tomar la medicina)*

- 162 tazones pequeños
- Una de las comidas o bebidas siguientes:
  - leche parcialmente descremada
  - leche parcialmente descremada de chocolate
  - leche (entera) de chocolate
  - pudín de chocolate (“chocolate pudding”, en inglés)
  - jugo de manzana mezclado con azúcar\*

*\* Si va preparar la mezcla con jugo de manzana, haga lo siguiente:*

- ◆ En otro tazón pequeño, ponga cuatro (4) **cucharaditas** planas de azúcar y cuatro (4) **cucharaditas** de jugo de manzana.
- ◆ Menee la mezcla hasta que se disuelva todo el azúcar.
- ◆ Luego siga las instrucciones 1 y 2 a continuación.

**Instrucciones:**

1. Ponga **una** (1) pastilla de doxiciclina de 100 mg en un tazón pequeño. Con el dorso de la cucharita de metal, muele la pastilla hasta que se vuelva un polvo fino. En el polvo no deben quedar pedazos grandes de la pastilla.
2. Agregue cuatro (4) **cucharaditas** planas de comida o bebida al polvo de doxiciclina. Mezcle hasta que el polvo se disuelva.

**Cantidad de la mezcla de Doxiciclina para niños**

El número de cucharaditas de mezcla de doxiciclina que se le debe dar a un niño depende del peso del niño. El cuadro a continuación le indica cuánto debe darle a su niño en **una dosis**. Debe darle **dos dosis** al día (una por la mañana y una por la tarde).

| <i>Si el niño pesa</i>       | <i>El niño debe tomar</i>                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0-5.6 kg / 0-12.5 lbs.       | <b>Media (1/2) cucharadita (3 ml)</b><br>de mezcla de Doxiciclina          |
| 5.6-11.3 kg / 12.5-25 lbs.   | <b>Una (1) cucharadita (5 ml)</b><br>de mezcla de Doxiciclina              |
| 11.3-17 kg / 25-37.5 lbs.    | <b>Una y media (1 ½) cucharaditas (8 ml)</b><br>de mezcla de Doxiciclina   |
| 17-22.6 kg / 37.5-50 lbs.    | <b>Dos (2) cucharaditas (10 ml)</b><br>de mezcla de Doxiciclina            |
| 22.6-28.3 kg / 50-62.5 lbs.  | <b>Dos y media (2½) cucharaditas (13 ml)</b><br>de mezcla de Doxiciclina   |
| 28.3-34.2 kg / 62.5-75 lbs.  | <b>Tres (3) cucharaditas (15 ml)</b><br>de mezcla de Doxiciclina           |
| 34.2-39.6 kg / 75-87.5 lbs.  | <b>Tres y media (3 ½) cucharaditas (18 ml)</b><br>de mezcla de Doxiciclina |
| 39.6-45.3 kg / 87.5-100 lbs. | <b>Cuatro (4) cucharaditas (20 ml)</b><br>de mezcla de Doxiciclina         |

Los niños expuestos al ántrax que pesan más de 100 libras deben tomar una (1) pastilla de 100 mg de doxiciclina dos veces al día (una por la mañana y una por la tarde) durante 60 días.

**Cómo almacenar la mezcla de doxiciclina ya preparada**

- La doxiciclina mezclada con cualquiera de las comidas o bebidas recomendadas retiene su eficacia durante 24 horas después de su preparación.
- Almacene la mezcla en un recipiente tapado. Las mezclas hechas con leche o budín deben mantenerse **siempre en el refrigerador**.
- Las mezclas hechas con jugo pueden almacenarse a temperatura ambiente.

*La FDA recomienda preparar las mezclas de doxiciclina a diario. Las porciones de la medicina no usadas deben echarse a la basura.*  
*Para más información sobre la doxiciclina, consulte:*  
[www.fda.gov/cder/drug/infopage/penG\\_doxy/default.htm](http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/penG_doxy/default.htm)