



Como retirar seringas descartadas com segurança

O problema:

- Usuários de drogas injetáveis descartem ilegalmente seringas em propriedades públicas. Seringas também podem entupir bueiros e tubulações em estações de tratamento de esgoto
- As seringas usadas podem conter sangue que pode ser infeccioso.
- Trabalhadores de limpeza podem ser expostos ao HIV, Hepatite-C ou Hepatite-B, se picotado por uma seringa usada. Os trabalhadores de limpeza devem evitar todo o contato da pele com seringas.

Como limpar seringas:

- **Traga luvas, alicates e um recipiente de materiais pontiagudos para o local de lixo.**
- Coloque luvas resistentes a perfurações.
- Não toque na seringa com suas mãos.
- Use um alicate para pegar a seringa.
- Coloque a seringa imediatamente em um recipiente para Descarte de Materiais Pontiagudos. Colocando o lado da agulha primeiro no recipiente
- Não caminhe pelo parque com a seringa, traga o recipiente com você. Não entregue a seringa a outra pessoa.
- Não recapitule a agulha. Se a seringa já estiver tampada, mantenha a tampa, ainda use um alicate e descarte a seringa num Recipiente de Descarte de Materiais Pontiagudos
- Retire suas luvas e descarte no saco de lixo de plástico.
- Lave as mãos ou use gel de álcool para limpar as mãos o mais rápido possível.
- Mantenha o recipiente de descarte de materiais pontiagudos num local seguro. Isso deve ser descartado como resíduo de risco biológico.

Quem pode fazer essa limpeza:

- O trabalhador deve ser treinado inicialmente e anualmente em Patógenos Transmísíveis pelo Sangue.
- O trabalhador deve receber a vacina contra a hepatite B antes de ser encaminhados para a limpeza da seringas.
- O trabalhador deve receber luvas, alicates, recipientes para descarte de materiais pontiagudos, desinfetante para as mãos com gel de álcool e acesso a uma bacia.
- O trabalhador deve saber onde procurar um acompanhamento médico imediato se receber uma picada de agulha.
- Se um trabalhador receber um corte ou uma picada de agulha de uma seringa usada, procure atendimento médico em seu hospital local o mais rápido possível. A clínica irá avaliar o risco de transmissão do HIV e hepatite, e pode recomendar medicação. O medicamento é mais eficaz nas primeiras 24 horas.

