



សត្វចៃដន្ន និងមូស

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងធ្វើឱ្យរដូវក្ដៅប្រចាំឆ្នាំកាន់តែក្ដៅជាងមុន និងយូរជាងមុន។ សីតុណ្ហភាពនៅដើមនិទាយរដូវ និងចុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះកំពុងកើនឡើង ហើយមានយប់ដែលត្រជាក់ក្រោមសីតុណ្ហភាពកកតិចជាងមុន។ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងនេះបង្កើនចំនួនថ្ងៃដែលសត្វចៃដន្នសកម្ម និងបង្កើនហានិភ័យដល់ជំងឺដែលកើតចេញពីសត្វចៃដន្ន ដូចជាជំងឺ Lyme និង Babesiosis ។

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏នឹងបង្កើនចំនួនថ្ងៃក្ដៅក្នុងរដូវក្ដៅ និងថ្ងៃដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង។ ភ្លៀងកាន់តែច្រើន និងរដូវក្ដៅកាន់តែយូរ បង្កើនថ្ងៃដែលមូសកំពុងបង្កាត់ពូជ និងខាំដែលនាំឱ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់ជំងឺដែលបណ្តាលមកពីមូសដូចជាមេរោគ West Nile (WNV) និង Eastern Equine Encephalitis (EEE)។

តើអ្នកណាមានហានិភ័យខ្ពស់?

- មនុស្សកំពុងធ្វើការ លេង ឬហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅ
- អ្នកដែលមានសត្វចិញ្ចឹមដែលចេញទៅក្រៅ

តើយើងអាចធ្វើអ្វីបានចំពោះបញ្ហានេះ?

សត្វចៃដន្ន៖

- ពាក់អាវដែវែង ខោវែង និងស្រោមជើងពេលចេញក្រៅ
- ពិនិត្យរកមើលសត្វចៃដន្ននៅលើខ្លួនអ្នក កុមារ និងសត្វចិញ្ចឹមបន្ទាប់ពីចំណាយពេលនៅខាងក្រៅ
- ត្រូវដឹងពីរោគសញ្ញាជំងឺដែលកើតពីសត្វចៃដន្នដូចជាកន្ទួលរមាស់ “រាងមូលក្រហម”
- ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធីការការពារជំងឺដែលបង្កដោយសត្វចៃដន្ន



មូស៖

- ប្រើថ្នាំបាញ់សត្វល្អិតគ្រប់ពេលដែលអ្នកនៅខាងក្រៅ
- ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែវែង
- រៀបចំកាលវិភាគសកម្មភាពក្រៅផ្ទះដើម្បីចៀសវាងម៉ោងពេលព្រលប់ដល់ព្រលឹម ក្នុងរដូវមានមូសច្រើនបំផុត
- ជួសជុលបង្អួច និងទ្វារដែលខូច
- យកទឹកដក់ចេញពីតំបន់ជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នក
- ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធីការការពារជំងឺពីមូស

