

رسائل حول

التطعيم ضد كوفيد-19 للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات

يمكن أن تساعدك هذه الرسائل القصيرة والواقعية في التحدث عن لقاح كوفيد-19 للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

يمكن أن يصاب الأطفال الصغار بمرض شديد من كوفيد-19. يمكنهم نشر الفيروس.

- يمكن أن يصاب كوفيد-19 الأطفال بمرض شديد. يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى أو مضاعفات صحية طويلة الأجل أو حتى الوفاة. اضطر عشرات الآلاف من الأطفال والمراهقين المصابين بكوفيد-19 إلى دخول المستشفى، ويحدث أن يصاب الأطفال بكوفيد لمدة طويلة.
- يمكن للأطفال أيضا نشر الفيروس إلى أشخاص آخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة الأكبر سنا.

لقاح كوفيد-19 هو أفضل طريقة لحماية الأطفال من الإصابة بالمرض الشديد من الفيروس.

- يساعد اللقاح أيضا على حماية الأطفال الصغار غير القادرين على ارتداء الأقنعة أو التباعد الاجتماعي.
- يساعد تطعيم الأطفال أيضا على حماية أحبائهم المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد من كوفيد-19.

يساعد التطعيم على منع الأطفال من الإصابة بمرض شديد من كوفيد-19.

- تماما مثل البالغين، قد ما زال الأطفال الذين جرى تطعيمهم مصابين بكوفيد، لكن التطعيم مهم. يساعد على منعهم من الإصابة بالمرض الشديد.

يجب أن يستمر تطعيم الأطفال، حتى لو كانوا قد أصيبوا بالفعل ب كوفيد-19.

- يتمتع الأشخاص الذين جرى تطعيمهم بالكامل بحماية أفضل من الأشخاص الذين أصيبوا فقط بكوفيد-19.
- إذا كان طفلك مصابا بفيروس كورونا، فيمكنه الحصول على التطعيم بمجرد تعافيه من المرض وانتهاء فترة عزله.

ما زال عليك تطعيم طفلك حتى لو جرى تطعيمك أثناء الحمل أو إذا جرى تطعيمك عند إرضاعه.

- في حين أن الأجسام المضادة يمكن أن تنتقل أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، فقد تقل الحماية بمرور الوقت.

أظهرت التجارب السريرية أن لقاح كوفيد-19 آمن وفعال.

- تمت دراسة سلامة اللقاحات على أكثر من 10000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات. كان لدى بعض الأطفال آثار جانبية خفيفة مثل التعب أو الحمى، لكن هذا لم يستمر طويلاً وتحسنت جميعها بسرعة.
- لقاح كوفيد-19 للأطفال هو نوع من اللقاحات يسمى لقاح mRNA، والذي تمت دراسته في التجارب الحيوانية والبشرية لسنوات، دون آثار طويلة الأجل.

خضعت جميع لقاحات كوفيد لمراجعة صارمة قبل الموافقة عليها لفئات عمرية محددة، بما في ذلك اللقاح للأطفال الأصغر سناً.

- الآثار الجانبية للقاح عادة ما تكون خفيفة ومؤقتة.
- قد يعاني بعض الأطفال من آثار جانبية خفيفة مثل التعب أو الصداع أو الحمى، مثل اللقاحات الأخرى. هذه علامات على أن الجسم يبني الحماية ضد كوفيد.

لقاح كوفيد-19 فعال للأطفال.

- أثبتت التجارب السريرية أن لقاح الأطفال هو وسيلة فعالة للوقاية من عدوى كوفيد والأمراض الخطيرة لدى الأطفال الصغار.
- أظهرت التجارب السريرية أن لقاح الأطفال الأصغر سناً فعال في تقليل معدل الإصابة وفي تحقيق مستويات مماثلة من المناعة لدى الأطفال كما هو الحال في المراهقين والبالغين.

يمكن تطعيم الأطفال من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم أو في المراكز الصحية وغيرها من المواقع التي تقدم التطعيم للأطفال الصغار.

- إذا كان ذلك ممكناً، اتصل بمقدم الرعاية الصحية لطفلك لتحديد موعد.
- إذا لم يكن لدى طفلك مقدم رعاية صحية، فاستخدم VaxFinder.mass.gov للعثور على موعد في صيدلية أو مركز صحي أو أي مكان آخر يقوم بتطعيم الأطفال الصغار.
- التطعيمات المنزلية متوفرة لأي شخص يواجه صعوبة في استخدام موقع التطعيم المجتمعي.

تعرف على المزيد على موقع

mass.gov/CovidVaccineYoungKids



Massachusetts
Department of
Public Health