

សារអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 សម្រាប់កុមារអាយុ 6ខែដល់ 5ឆ្នាំ

សារពិតខ្លះៗទាំងនេះអាចជួយអ្នកកុំឱ្យពិភាក្សាអំពីវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-19 សម្រាប់កុមារអាយុ 6ខែដល់ 5ឆ្នាំ។

កុមារតូចៗអាចផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកដទៃដឹងអំពីជំងឺកូវីដ-19។ ពួកគេអាចចម្លងវីរុសនេះ។

- ជំងឺកូវីដ-19 អាចផ្ទុះឡើងក្នុងកុមារឈឺធ្ងន់ធ្ងរបាន។ វាអាចនាំឱ្យមានការចូលសម្រាកពេទ្យ រោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ស្ថានភាពរយៈពេលវែង ឬថ្ងៃទាំងអស់អាចស្លាប់បាត់ជីវិតផងក៏មាន។ កុមារនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមិននាក់ដល់មានជំងឺកូវីដ-19 មានចូលសម្រាកពេទ្យ ហើយ ផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃជំងឺកូវីដ ពិតជាកើតមានក្នុងចំណោមកុមារ។
- កុមារក៏អាចចម្លងវីរុសនេះទៅអ្នកដទៃរួមទាំងសមាជិកគ្រួសារវិញចំណាស់ផងដែរ។

វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 គឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការបង្ការកុមារកុំឱ្យផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកដទៃដឹងអំពីជំងឺកូវីដ-19។

- វ៉ាក់សាំងក៏ជួយការពារកុមារតូចៗដែលមិនអាចពាក់ម៉ាស់ ឬរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបាន។
- ការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារក៏អាចជួយការពារមនុស្សជាទីសុំឡាញ់ដែលមានហានិភ័យប្រឈមនឹងការឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺកូវីដ-19។ COVID-19.

ការចាក់វ៉ាក់សាំងជួយបង្ការកុំឱ្យកុមារផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកដទៃដឹងអំពីជំងឺកូវីដ-19។

- ដូចមនុស្សសព្វញ្ញវ័យដទៃ កុមារដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏អាចកើតជំងឺកូវីដ ប៉ុន្តែការបានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជារឿងសំខាន់។ វាជួយបង្ការពួកគេកុំឱ្យផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកដទៃដឹងអំពីជំងឺកូវីដ-19។

កុមារគួរតែបន្តត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំង បើទោះបីជាពួកគេបានកើតជំងឺកូវីដ-19 ហើយក៏ដោយ។

- អ្នកដទៃដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួន ទទួលបានការការពារល្អបំផុតស្របទៅនឹងអ្នកដទៃដែលគ្មានតែបានផ្តល់ជំងឺកូវីដ-19។
- បុរសនិងប្រពន្ធរបស់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង ពួកគេអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបាននៅពេលណាពួកគេស្ថិតនៅស្ថានភាពស្របច្បាប់ និងរយៈពេលនៃការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅជាចម្ងាយឡើយបានបញ្ចប់។

អ្នកគួរតែបន្តផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់កូនអ្នក ទោះបីជាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអំឡុងពេលមានផ្ទុះពេទ្យ ឬមិនថាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលអ្នកបានបំបៅដោះពួកគេ ឬយ៉ាងណានោះទេ។

- ពិតមែនតែអ្វីដែលអ្នកអាចចម្លងបន្តទៅកូននៅអំឡុងពេលមានផ្ទុះពេទ្យនិងបំបៅដោះកូន ប៉ុន្តែការការពារអាចនឹងថយចុះពេលមួយទៅពេលមួយ។
- ពិតមែនតែអ្វីដែលអ្នកអាចចម្លងបន្តទៅកូននៅអំឡុងពេលមានផ្ទុះពេទ្យនិងបំបៅដោះកូន ប៉ុន្តែការការពារអាចនឹងថយចុះពេលមួយទៅពេលមួយ។

ការសាកល្បងព្យាបាលមានបង្កហាញថា វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 គឺមានសុវត្ថិភាព និងមានបុរសិទ្ធភាព។

- សុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេសិក្សាស្រាវជ្រាវ 10,000នាក់ ដដែលមានអាយុពី 6ខែដល់ 5ឆ្នាំ។ កុមារមួយចំនួនមានផលរំខានតិចតួច ដូចជាការអស់កម្លាំង ឬគ្រុនក្អកទៅជាដើម ប៉ុន្តែផលរំខាននេះមិនបានកើតមានយូរនោះទេ ហើយពួកគេទាំងអស់នោះបានជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
- វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 សម្រាប់កុមារ គឺជាបុរសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងដដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាក់សាំង mRNA ដដែលគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងការពិសោធន៍សាកល្បងទៅលើសត្វនិងមនុស្សសង្ខេបរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដោយពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយ។

គ្រប់វ៉ាក់សាំងកូវីដទាំងអស់ សុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់មុនពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់ទៅដល់កុមារអាយុជាក់លាក់ណាមួយ រួមទាំងវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារតូចៗផងដែរ។

- ផលរំខានសម្រាប់វ៉ាក់សាំងនេះ ជាធម្មតាមានសភាពស្មុគស្មាញ និងបណ្តោះអាសន្ន។
- កុមារមួយចំនួនអាចនឹងទទួលបាន ផលរំខានដូចជាការអស់កម្លាំង ឈឺក្បាល ឬគ្រុនក្អកទៅ ដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងដទៃទៀតដែរ។ ទាំងនេះគឺជាសញ្ញាដែលរាងកាយកំពុងបង្កកើតការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ។

វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 មានបុរសិទ្ធភាពសម្រាប់កុមារ។

- ការសាកល្បងព្យាបាលបញ្ជាក់ច្បាស់ថា វ៉ាក់សាំងគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានបុរសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កការការពារផលជំងឺកូវីដ និងជំងឺផ្សេងៗទៀតលើកុមារតូចៗ។
- ការសាកល្បងព្យាបាលមានបង្កហាញថា វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារតូចៗគឺមានបុរសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រានៃការឆ្លង និងក្នុងការបង្កកើតកម្រិតភាពស៊ាំក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលលើខ្លួនកុមារ ដូចគ្នាទៅនឹងលើខ្លួនជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យដែរ។

កុមារអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព និងទីតាំងផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព។

- បុរសិនបើអាចផ្តល់ឈ្មោះ សូមទាក់ទងទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់កូនអ្នកដើម្បីកំណត់ពេលវេលាជួបពិគ្រោះ។
- បុរសិនបើកូនរបស់អ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនោះទេ សូមប្រើគេហទំព័រ VaxFinder.mass.gov ដើម្បីស្វែងរកការណ៍តំបន់ពិគ្រោះនោះទៅតាមឱសថស្ថាន មណ្ឌលសុខភាព ឬទីតាំងផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពវ៉ាក់សាំងដល់កុមារតូចៗ។
- ការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមផ្ទះ គឺមានផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកដែលមានការលំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង។

