

Se ha encontrado influenza aviar altamente patógena (IAAP) en aves acuáticas silvestres, aves domésticas o ambas a lo largo de la costa desde Canadá hasta Florida, incluidos Massachusetts y otros estados de Nueva Inglaterra. La vigilancia de la IAAP en aves domésticas y silvestres en MA es continua.

Todas las aves de corral domésticas en Massachusetts pueden estar en riesgo de exposición al IAAP.

Utilice una buena bioseguridad para proteger a sus aves y sus instalaciones contra el virus.

La influenza aviar puede afectar a las aves silvestres o domesticadas. La mayoría de las aves de corral, incluidos los pollos, los pavos, las pintadas y las aves de caza como los faisanes, morirán a los pocos días de la exposición a la IAAP. Los patos silvestres y domésticos y algunas otras especies pueden infectarse sin enfermarse. Las aves de corral domésticas son expuestas al IAAP a través del contacto con aves infectadas, con sus excrementos o sus plumas. Los pastos, patios, estanques y equipos se contaminan fácilmente con el virus IAAP. Si bien ningún ser humano se ha infectado con el virus IAAP en los EE. UU., los seres humanos pueden mover inadvertidamente material contaminado con IAAP para que entre en contacto con aves domésticas mediante el uso de equipos, ropa, calzado y llantas de vehículos contaminadas.

Practicar la bioseguridad significa tomar las medidas necesarias para reducir las posibilidades de que las enfermedades infecciosas entren o salgan de su granja. El primer paso es identificar las formas de mitigar los mayores riesgos de la influenza aviar para sus aves o granja.

Reduzca los riesgos para la parvada

- Nunca introduzca aves adultas en una parvada establecida a menos que pasen la cuarentena (aislamiento de 30 días) o estén libres de enfermedades. Trate a las aves que regresan de las exhibiciones como si fueran nuevas en la parvada.
- No albergue especies diferentes juntas (por ejemplo, pollos con pavos o aves acuáticas).
- Evite que los visitantes accedan a sus corrales o gallineros. No visite otras instalaciones avícolas.
- Confine a las aves a un área interior (gallinero cubierto o edificio anexo).
- No comparta equipo, suministros o vehículos con otros propietarios de aves.
- Use un pediluvio desinfectante antes de entrar al gallinero u otras áreas avícolas.
- Limpie y desinfecte todo el equipo, zapatos, ropa y vehículos antes de ingresar a las áreas avícolas.
- Retire la suciedad y el estiércol de las superficies antes de la desinfección. "No puede limpiar la suciedad".
- Practique "todos dentro, todos fuera" al cambiar parvadas. Deshágase de todas las aves y desinfecte el gallinero antes de traer aves nuevas.
- Revise mensualmente si hay parásitos y trátelos si es necesario. Use un área de limpieza para evitar parásitos externos.
- Mantenga insectos y animales como mascotas, roedores y animales salvajes, especialmente pájaros salvajes, fuera del gallinero y del alimento.



Medidas de bioseguridad de sentido común

- Mantenga a sus aves en un entorno seguro.
- Asegúrese de que todos los que cuiden de sus aves sigan todos los planes de bioseguridad para su parvada. Siga los protocolos de bioseguridad cada vez que ingrese a las áreas avícolas.
- Use ropa y zapatos separados y dedicados cuando trabaje con sus aves.
- Limpie el alimento derramado y evite que las aves silvestres accedan a las áreas de alimento y avícolas.

- No ingrese a sus áreas avícolas ni manipule a sus aves o equipo después de cazar, pescar o entrar en contacto con cualquier otra ave o áreas que sean frecuentadas por las aves silvestres.
- Nunca compre aves de una fuente desconocida, como subastas u otros mercados de aves vivas.
- Cuide de sus aves en orden de edad y salud, de los más jóvenes a los más viejos. Albergue a las aves enfermas en un área separada y bríndeles atención al final. Idealmente, otra persona debería cuidar de las aves enfermas.

Precauciones para las aves de corral de libre pastoreo

Los productores avícolas y los propietarios de aves de traspatio que crían aves en sistemas al aire libre sin confinamiento deben evitar el contacto con aves silvestres, en particular aves acuáticas y excrementos de aves silvestres.

- Identifique áreas de alto riesgo, incluidos los humedales a lo largo de las rutas migratorias, las áreas donde se congregan las aves acuáticas silvestres o las aves playeras y las áreas de producción avícola de alta densidad.
- Implemente medidas preventivas en las áreas de alto riesgo:
 - Mantenga a las aves en el interior tanto como sea posible.
 - Los corrales al aire libre deben tener techos sólidos y malla de alambre o lados enmallados.
 - Proporcione alimento y agua para todas las aves de corral de libre pastoreo en un área interior.
 - Impida el acceso a arroyos, estanques y otras aguas superficiales que podrían estar contaminadas con excrementos de aves silvestres.
 - Instale y use un pediluvio desinfectante antes de ingresar al gallinero u otras áreas avícolas. Esto puede ser tan simple como una cubeta con una tapa segura y un cepillo de mango largo para tallar el calzado antes de entrar.



¡No mezcle a sus aves con otros animales de producción!

Si su parvada se infecta de IAAP, es posible que no pueda mover leche u otros productos agrícolas a menos que sus aves se mantengan separadas y que haya implementado buenas prácticas de bioseguridad.

Esté atento a los signos de enfermedad

Es importante conocer los signos de advertencia de enfermedades como la influenza aviar. Las aves con IAAP producen más virus con el tiempo. La detección temprana ayuda a evitar la propagación de la enfermedad. Esté atento a estos signos:

- Aumento de las muertes inexplicables en su parvada, con o sin síntomas.
- Estornudos, falta de aire, tos y/o secreción nasal.
- Disminución en el consumo de agua o alimento.
- Diarrea verde y acuosa.
- Falta de energía o silencio inusual.
- Caída en la producción de huevos, o huevos blandos o de cáscara delgada y deformes.
- Inflamación alrededor de los ojos, el cuello o la cabeza.
- Decoloración púrpura de las barbas, crestas y patas.

Si tiene aves enfermas o muertas, contacte a
MDAR
 MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESOURCES
617-626-1795

Si sospecha influenza aviar

- **iNo espere! Llame de inmediato.** Reporte las aves de corral enfermas o muertas al Departamento de Recursos Agrícolas, División de Salud Animal del Estado de Massachusetts al [617-626-1795](tel:617-626-1795) o a la USDA al [1-866-536-7593](tel:1-866-536-7593).
- No mueva ningún ave dentro o fuera de sus instalaciones.

Más información

- Bioseguridad: Defiende a la parvada - USDA: <https://healthybirds.aphis.usda.gov/>
- Bioseguridad: Universidad Estatal de Iowa: <https://poultrybiosecurity.org/>
- Detecciones recientes de IAAP: USDA: <https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai>
- Política de respuesta al IAAP del USDA: <https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/emergency-management/hpai/fadprep-hpai>

Preparado por el Departamento de Recursos Agrícolas de Massachusetts 1/3/2022 Fotografías usadas con permiso C. Sexton.